

Le 11 mars 2025

Aux : Élèves, aux parents et aux membres du personnel des écoles de niveaux primaire et secondaire ainsi que les élèves des centres de formation aux adultes et professionnelles

Objet : **Important!** Vaccination contre la rougeole

Bonjour à tous,

Le MEQ a demandé que l'information suivante de Santé Publique soit distribuée à tous les élèves, parents et personnel de toutes les commissions scolaires de la province du Québec:

Madame, Monsieur,

Actuellement, des cas de rougeole sont déclarés dans différentes régions du Québec. Comme la rougeole est en hausse dans plusieurs pays du monde, des voyageurs peuvent contracter la rougeole à l'extérieur et être la source d'éclosions au Québec au retour de voyage.

La rougeole est une maladie respiratoire très contagieuse qui peut entraîner de nombreuses complications et de graves conséquences. Au Canada, une personne sur 3 000 en décède.

Il n'y a pas de traitement particulier contre cette maladie, mais elle peut être évitée par la vaccination. **La vaccination est le meilleur moyen de se protéger.** Deux (2) doses de vaccin protègent à plus de 95 %.

Quoi faire?

Vérifiez le carnet de vaccination de votre enfant pour savoir s'il a reçu 2 doses de vaccin contre la rougeole à l'âge de 1 an ou plus. Profitez-en pour vérifier votre protection et celle des autres membres de votre famille.

Au Québec, une personne est protégée si :		Exemples de noms de vaccins de rougeole
Personne née depuis 1980	Elle a reçu 2 doses de vaccin (à partir de l'âge de 12 mois)	<ul style="list-style-type: none"> • Priorix • Priorix-Tetra • MMR II • ProQuad • Attenuvax • Moru-Viraten • Rimevax • RRO • Trivirix • Vaccin antirougeoleux
Personne née entre 1970 et 1979	Elle a reçu 1 dose de vaccin (à partir de l'âge de 12 mois) Si elle est une travailleuse de la santé ou stagiaire, voyageuse ou recrue militaire, 2 doses sont nécessaires.	
Personne née avant 1970	Elle est considérée comme protégée, même sans vaccin et peu importe le pays de naissance	
À n'importe quel âge	Elle a déjà eu la rougeole ou elle a une preuve (certificat médical ou prise de sang)	

Il est fortement recommandé aux personnes qui ne sont pas protégées de se faire vacciner le plus rapidement possible. **Si un cas de rougeole survient dans une école, toutes les personnes non protégées, enfants et adultes, sont exclues de l'école pour une période pouvant s'étendre jusqu'à plusieurs semaines.**

Le vaccin est gratuit. Vous pouvez prendre un rendez-vous sur [Cllic Santé](#) ou appeler au 1-877-644-4545.

Pour avoir plus d'informations sur la rougeole ou le vaccin, consultez la page [Rougeole](#).

Merci de votre collaboration et de votre vigilance.



George Singfield
Directeur général



Rougeole : Informations supplémentaires

Comment se transmet le virus?

La rougeole est extrêmement contagieuse. Si une personne non protégée est en contact avec le virus, le risque d'attraper la rougeole est de 9 sur 10. Le virus s'attrape en respirant le même air qu'une personne infectée, même sur une distance de plus de 2 mètres (6 pieds). Le virus peut survivre quelques heures en suspension dans l'air et peut même se disperser. La maladie peut aussi se transmettre par contact direct quand on touche une personne infectée ou des objets contaminés.

Quelles sont les complications possibles?

La rougeole peut entraîner des otites et des diarrhées persistantes, surtout chez les nourrissons, mais aussi des complications rares et graves. Les enfants qui ont la rougeole risquent d'avoir une infection des poumons (pneumonie), une perte de la vue ou de l'audition, une infection du cerveau (1 cas sur 1 000 à 2 000 environ), et ils peuvent même en mourir. Environ 1 personne sur 10 doit être traitée à l'hôpital.

Toutes les personnes infectées peuvent avoir des complications, mais surtout :

- les enfants âgés de moins de 1 an;
- les personnes enceintes (risque de fausse couche ou d'accouchement prématuré);
- les personnes avec un système immunitaire faible.

Quels sont les symptômes de rougeole?

- Fièvre
- Toux
- Nez qui coule
- Conjonctivite (yeux rouges qui coulent et sensibles à la lumière)
- Boutons et/ou rougeurs sur la peau (sur le visage, puis sur tout le corps)

Une personne qui a la rougeole est contagieuse 4 jours avant et jusqu'à 4 jours après l'apparition des boutons. La maladie dure de 1 à 2 semaines.

Quoi faire en cas de symptômes de rougeole?

Si votre enfant ou un membre de votre famille a des symptômes de rougeole, restez à la maison et appelez Info-Santé 811. Si vous devez aller dans une clinique ou à l'hôpital, appelez avant de sortir pour les avvertir que vous ou votre enfant avez peut-être la rougeole. Si cela n'est pas possible, avisez la personne à l'accueil, dès votre arrivée. Le port du masque est fortement recommandé.